

Conditions préalables

- La formation a une durée de 10h
- La formation est dispensée par l'ensemble des médecins généralistes adhérents au protocole afin d'harmoniser les pratiques. Parmi eux se trouve au moins un maître de stage des universités
- Le contenu de la formation est issu de l'Unf3s et reprend l'item 146 du campus d'ORL collège français d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Il est disponible ici :
<http://campus.cerimes.fr/orl/enseignement/angine/site/html/>

Documents associés

- « PR. 01.2 – Formulaire de prise en charge patient »
- « PR. 01.7 – Modèle de prescription type »
- « E.03 – Attestation de formation du pharmacien d'officine ou de l'IDE »

Contenu et objectifs de la formation (1/2)

	Compétence à acquérir	Objectifs pédagogiques	Programme
Déroulé du protocole et clinique	Capacité à identifier les critères et/ou symptômes pour lesquels la réponse DOIT être médicale et ne peut être déléguée	<p><u>Pour les IDE et les pharmaciens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Établir, avec les médecins formateurs une liste (exhaustive et validée par la littérature) des critères justifiant un renvoi vers le médecin. Effectuer l'examen permettant de définir le score de Mac Isaac <p><u>Pour les médecins, pharmaciens et IDE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Intégrer la liste et l'évaluation du score de Mac-Isaac dans un formulaire informatique intégré au dossier patient <p><u>Pour les IDE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Savoir identifier le(s) traitement(s) immunosuppresseur(s) sur une ordonnance 	<ul style="list-style-type: none"> Définition de l'angine et diagnostics différentiels à éliminer dont les signes de gravité (identification par photo) Point d'attention sur les pièges, leur gravité et les dangers qu'ils représentent pour les patients Rappel de la terminologie Présentation de l'arbre décisionnel Reconnaissance sur photo d'une angine et des différents types (angine pseudo-membraneuse, herpangine, phlegmon de l'amygdale et angine ulcéro-nécrotique) <p><u>Formation au score de Mac-Isaac</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Recherche d'adénopathies cervicales douloureuses Recherche d'exsudat amygdalien

Contenu et objectifs de la formation (2/2)

	Compétence à acquérir	Objectifs pédagogiques	Programme
TROD angine et thérapeutique	Effectuer un TROD angine Identifier la molécule à prescrire et la posologie	<p>Pour les IDE et les pharmaciens :</p> <ul style="list-style-type: none"> Effectuer un Test Rapide d'Orientation Diagnostique de l'angine Être capable de choisir quelle molécule prescrire en fonction des recommandations 	<ul style="list-style-type: none"> Démonstration de l'utilisation du TROD angine et essai par les délégués Présentation des recommandations de la SPILF sur le mal de gorge¹ Présentation des molécules et de leurs effets secondaires et repérage d'une allergie ou d'une contre-indication au traitement Présentation du danger de l'automédication par aspirine ou AINS Élaboration de deux prescriptions types (antibiothérapie et/ou traitement symptomatique) et introduction de celle-ci dans le formulaire de prise en charge patient (Cf. documents associés « PR. 01.2 – Formulaire de prise en charge patient » et « PR. 01.7 – Modèle de prescription type ») Présentation des recommandations arrêt de travail
	<p>Cette partie de la formation est à recommencer en cas de modification des recommandations d'antibiothérapie (veille documentaire réalisée par les médecins)</p>		

¹SPILF - SFP - GPIIP. Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et de l'enfant. Recommandations de bonne pratique. Novembre 2011

Evaluation des connaissances

La formation est validée par les médecins après la réussite de 10 cas pratiques/jeux de rôle pour lesquels les IDE et les pharmaciens auront :

- Éliminé ou identifié les critères d'exclusion
- Défini le score de Mac-Isaac et l'utilité du TROD angine
- Prescrit, le cas échéant, la bonne molécule

Quand réaliser l'évaluation ?

- En fin de parcours de formation
- 3 mois après la formation, puis tous les 6 mois lors du groupe d'analyse de pratique

Une fois l'évaluation des savoirs validée, les médecins formateurs remettent au pharmacien d'officine ou à l'IDE une attestation de formation (Cf. document associé « *E.03 – Attestation de formation du pharmacien d'officine ou de l'IDE* »)

Éléments pour établir la prescription type (à insérer dans ce formulaire au cours de la formation)

Traitement antibiotique en cas d'angine à TDR positif chez l'ADULTE

Molécule	Posologie	Durée
Amoxicilline	2g/j en 2 prises	6 jours
Céfuroxime-axétil (si allergie bénigne à la pénicilline)	500mg/j en 2 prises	4 jours
Azithromycine (si contre-indication aux bêta-lactamines)	500mg/j en 1 prise	3j

Traitement antibiotique en cas d'angine à TDR positif chez l'ENFANT

Molécule	Posologie	Durée
Amoxicilline	50mg/kg/j en 2 prises, sans dépasser la posologie adulte	6 jours
Cefpodoxime-proxétil (si allergie bénigne à la pénicilline)	8mg/kg/j en 2 prises	5 jours
Azithromycine (si contre-indication aux bêta-lactamines)	20mg/kg/j en 1 prise sans dépasser la posologie adulte	3j

Traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs

- Paracétamol uniquement
- Pas d'autre traitement : ni aspirine, ni AINS, ni vasoconstricteur

Autres conseils :

- Boire des boissons chaudes ou froides selon ce qui soulage le plus
- Sucrer des glaçons, des bonbons ou des pastilles
- Consulter le médecin en cas de persistance des symptômes à 72h ou d'aggravation de ceux-ci
- Rédaction d'un certificat si nécessaire

Nom de la structure pluriprofessionnelle	
Date de rédaction initiale	30/08/2021
Dernière date de révision	30/08/2021
N° de version actuel	1
Nombre de pages	5
Date de validation	30/08/2021
Référence du document	PR. 01.1 – Programme de formation des IDE et des pharmaciens d'officine
Rédigé par	Gaillard Thibault
Accepté par	

Historique

N° de version	Date de modification	Modifications apportée