


### Arbre décisionnel

**Critère d'inclusion** : Mal de gorge augmenté par la déglutition chez le patient entre 6 et 45 ans dont le médecin traitant est un médecin déléguant et qui n'a pas refusé l'accès à son dossier médical au pharmacien d'officine ou à l'infirmier diplômé d'état

Vérification par le pharmacien d'officine ou l'IDE de la présence de critères d'exclusion au moyen d'un formulaire à intégrer au système d'information partagé



Traitement symptomatique :

- Boissons chaudes ou froides, glaçons, miel
- Paracétamol ET RIEN D'AUTRE (pas d'AINS, d'aspirine, de vasoconstricteurs périphériques...)
- Lavage nasal au sérum physiologique en cas de rhinorrhée

Certificat si besoin (arrêt maladie selon référentiel Ameli, enfant malade)

Conseil : consulter un médecin en cas d'absence d'amélioration des symptômes

### Informations sur le patient

Nom..... Prénom..... Date de naissance.../.../...  
N° de sécurité sociale.....  
Médecin traitant.....  
Consentement du patient ou de son représentant légal à l'inclusion dans le protocole ?  
 Oui  Non

### Professionnel ayant réalisé la prise en charge

Infirmier  Pharmacien  
Nom..... Prénom.....  
N° RPPS.....  
Date et heure de la prise en charge.....

## Données de l'anamnèse

A l'interrogatoire du patient, notez- vous les critères d'exclusion suivants ?

Critères d'exclusion	Oui	Non
Age : < 6 ans ou >45 ans ?		
Retour de voyage avec fièvre dans les 2 à 5 jours ?		
Statut vaccinal : non renseigné ou vaccination à réaliser ?		
Durée d'évolution des symptômes >8jours ?		
Le patient a-t-il de la toux ?		
Le patient a-t-il des éruptions cutanées ?		
Fièvre >39,5°C ?		
Vomissements et/ou diarrhée chez l'enfant ?		
Grossesse avérée ou non exclue ?		

Immunodépression grave ? (Due au VIH, traitement par chimiothérapie, immunosuppresseurs ou corticostéroïdes oraux au long court)		
Insuffisance rénale connue (Clairance <30mL/min selon CKD EPI)		
Le patient est-il vu pour la 2 <sup>ème</sup> fois dans le cadre de ce protocole dans les 6 mois suivant le premier épisode ?		
Antibiothérapie en cours pour un autre motif ?		

Doute du pharmacien d'officine ou de l'infirmier diplômé d'état ?

Oui  Non

Si oui, préciser : .....

Au terme de l'anamnèse, le patient est-il réorienté vers le médecin généraliste ? **(Si au moins une case « oui », réorienter vers le médecin)**

Oui  Non

### Données cliniques

A l'examen clinique du patient, notez- vous les critères d'exclusion suivants ?

Critères d'exclusion		Oui	Non
Premiers signes cliniques d'exclusion	Angine ulcéro-nécrotique		
	Herpangine		
	Angine pseudo-membraneuse		
	Alévation de l'état général		
	Fièvre >39,5°C		
	<b>Trismus</b>		
	Hypersialorrhée		

Critères d'exclusion		Oui	Non
Seconds signes d'exclusion : signes évocateurs d'un phlegmon de l'amygdale ou de complication locorégionale	Déviations médiales de l'amygdale		
	Œdème ou voussure du voile		
	Luette déviée du côté sain		
	Difficulté à parler ou respirer		
	Cervicalgie concomitante (torticolis)		
Prise de paramètres	Tachycardie >110/min		
	Fréquence respiratoire >20/min		
	Tension artérielle <90/60mmHg		

Doute du pharmacien d'officine ou de l'infirmier diplômé d'état ?

Oui  Non

Si oui, préciser : .....

Au terme de l'examen clinique, le patient est-il réorienté vers le médecin généraliste ? (**Si au moins une case « oui », réorienter vers le médecin**)

Oui  Non

### Score de Mac-Isaac


Le score de Mac Isaac a-t-il été réalisé ?

Oui  Non

Si non, pour quelle raison ?

Le patient a moins de 15 ans

Le patient présente un critère d'exclusion et a été réorienté vers le médecin

Calcul du score de Mac-Isaac en page suivante 

Éléments cliniques	Points à attribuer	Score du patient
Age entre 15 et 44 ans	0	
Température >38°C	1 (0 si <38°C)	
Absence de toux	1 (0 si présence et exclusion et orientation médicale)	
Adénopathies cervicales sensibles	1 si oui (0 si absence)	
Atteinte amygdalienne (augmentation de volume ou exsudat)	1 si oui (0 si absence)	
	Score total du patient	

### Interprétation du score :

- <2 : angine à streptocoque peu probable, pas de TDR nécessaire, pas d'indication d'antibiothérapie
- ≥ 2 : faire un TDR

## TROD

Le TROD a-t-il été réalisé ?

- Oui  Non

### Si non, pour quelle raison ?

- Le score de Mac Isaac est <2  
 Le patient présente un critère d'exclusion et a été réorienté vers le médecin

### Quel est le résultat du TROD s'il a été réalisé ?

- Positif  
 Négatif  
 Impossible à réaliser (Préciser la raison .....)

Marque et modèle du TROD : .....

N° de lot : .....

Date d'expiration : .....

**Si le TDR est impossible à réaliser, réorienter vers le médecin**

<b>Nom de la structure pluriprofessionnelle</b>	
<b>Date de rédaction initiale</b>	30/08/2021
<b>Dernière date de révision</b>	30/08/2021
<b>N° de version actuel</b>	1
<b>Nombre de pages</b>	5
<b>Date de validation</b>	30/08/2021
<b>Référence du document</b>	PR. 01.2 – Formulaire de prise en charge du patient
<b>Rédigé par</b>	Gaillard Thibault
<b>Accepté par</b>	

### Historique

<b>N° de version</b>	<b>Date de modification</b>	<b>Modifications apportée</b>